

Les réflexes archaïques en OROMYO

Tests et Intérêts



Ostéopathie Transversale
<https://osteopathie-transversale.fr/>

Réflexe	Zone concernée	Fonctions clés	Conséquences de la persistance	Test	Négatif/ Positif
Tonique Asymétrique du Cou	Cou/Tête/bras	Coordination œil-main, latéralité	Troubles de posture de l'écriture, maladresse,	Test : Position quadrupède ou assise bras tendus devant, tourner la tête à droite et à gauche.	- Intégré : Aucun mouvement des bras/jambes. Non intégré- Un bras se tend, l'autre se fléchit involontairement.
Succion	Bouche	Alimentation	Troubles alimentaires, d'élocution	Stimuler les lèvres	Intégré- ras. Non intégré - succion
Points cardinaux	Joues, bouche	Recherche du sein, biberon	Hypersensibilité faciale, troubles de la succions	Toucher la joue	Intégré- pas de réaction . Non intégré: mot tête ou bouche
Moro	Tête, bras	Reflexe de survie	Hyperréactivité, stress, anxiété	Bruit soudain derrière	Intégré- réaction faible. Non intégré- sursaut voire ouverture des bras

Réflexe	Zone concernée	Fonctions clés	Conséquences de la persistance	Test	Négatif/ Positif
Agrippement palmaire	Mains	Prise reflexe	Difficulté à se relâcher, écriture crispée	Stimuler paume de main	Intégré- Ras. Non intégré- fermeture de la main
Nauséux	Bouche, gorge	Protection contre l'étouffement	Hypersensibilité orale, troubles alimentaires	Stimulation de la langue	Intégré- ok Non intégré - haut le coeur
Bakking buccal	Langue	Préparation à la succion, tétée	Troubles de déglutition, succion immature, trouble de l'articulation (langage oral)	Exercer une légère pression au centre de la langue ou juste derrière la lèvre inférieure.	Intégré-langue reste en place. Non intégré- profusion de la langue
Latéralité linguale	Langue	Mastication, gestion des aliments solides	Troubles de mastication, difficulté d'exploration orale, dysoralité sensorielle	Stimuler le d ord latéral de la langue	Intégré- pas de mouvement lingual Non intégré- déplacement de la langue vers le stimulus
Morsure réflexe (ou réflexe de mordement)	Gencives ou face interne des lèvres	Préparation à la mastication	Bruxisme, difficulté à relâcher la mâchoire, troubles de phonation	Stimuler les gencives ou face interne des lèvres	Intégré- absence de fermeture involontaire. Non intégré-morsure